

# คาถา ๕ ย กันสุนัขกัด ຄາຖາ 5 ຍ ກັນໝາກັດ

เมื่อถูกสุนัข หรือแมว กัด ข่วน ต้องทำดังนี้  
ເມື່ອຖືກໝາ ຫຼື ແມວ ກັດ ຊູດ ຕ້ອງເຮັດດັ່ງນີ້:



# ໂລກໝາວໍ

ປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼີກລຽງລົດຄວາມສ່ຽງ  
ຈາກການຖືກໝາກັດ



**ຍ 1** **อย่าเหยย**  
สุนัขให้โมโห  
ຢ່າເຮັດໃຫ້ໝາຮ້າຍ

**ຍ 2** **อย่าเหยียบ**  
หาง หัว ตัว ขา  
หรือทำให้สุนัขตกใจ  
ຢ່າຢຽບຫາງ ຫົວ ຕົວ  
ຂາ ຫຼືເຮັດໃຫ້ໝາຕົກໃຈ

**ຍ 3** **อย่าแยก** สุนัขที่กำลัง  
กัดกันด้วยมือเปล่า  
ຢ່າເຂົ້າໄປຂັດຂວາງໝາ  
ທີ່ກຳລັງກັດກັນດ້ວຍມືເປົ່າ

**ຍ 4** **อย่าหยิบ** จานข้าว  
หรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะ  
สุนัขกำลังกินอาหาร  
ຢ່າຈັບຈານເຂົ້າ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍ  
ອາຫານໃນຂະນະໝາກຳລັງກິນອາຫານ

**ຍ 5** **อย่ายุ่ง** หรือเข้าใกล้สุนัข  
ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ  
ຢ່າຍຸ້ງ ຫຼື ເຂົ້າໃກ້ໝາ  
ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ຫຼື ບໍ່ມີເຈົ້າຂອງ



**1** **ล้างแผล**  
ให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ  
ครั้ง ให้ถึงก้นแผล ล้างสบู่ออกให้หมด  
ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ ໄສຍາ ຮັກສາແຜລສດ  
ລ້າງບາດແຜໃຫ້ສະອາດ  
ດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູຫຼາຍໆ  
ຄັ້ງ ໃຫ້ຄັກແນ່ ລ້າງສະບູ  
ອອກໃຫ້ໝົດ ເຊັດໃຫ້ແຮ້ງ  
ໃສ່ຢ່າຮັກສາແຜລສດ

**2** **จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้**  
เพื่อสืบหาเจ้าของ/กักหมา-แมว ไว้ดู  
อาการ ๑๐ วัน สอบถามประวัติการ  
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ຈີ່ສັດທີ່ກັດໃຫ້ໄດ້ເພື່ອສືບ  
ຫາເຈົ້າຂອງ ກັກໝາ ແລະ  
ແມວ ໄວ້ເບິ່ງອາການ 10 ວັນ  
ສອບຖາມການສົດວັກຊີນ  
ປ້ອງກັນໂລກໝາບ້າ

**3** **ไปหาหมอ**  
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
เพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง  
ໄປຫາໝໍ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່  
ສາທາລະນະສຸກເພື່ອຮັບ  
ການປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

# โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ

เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต พบมากที่สุดในสุนัข รองลงมาคือ แมว คนและสัตว์รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อกัดหรือข่วน โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมว จะพบว่ามีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าออกมาบนน้ำลายตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ ๑ - ๗ วัน

# โลภขาจัว โลภขาจัว ขี้ โลภข่านมจัว

เกิดจากไวรัสเรบีส เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น: ชะนี กระรอก กระแต ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ๑-๗ วัน ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ๑-๗ วัน ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ๑-๗ วัน



**อาการที่พบในคน** ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ ๓ สัปดาห์ - ๖ เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน ๑ ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำ ปวดท้องน้อยและขากรรไกร เนื้อกระดูก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติและตายในที่สุด

**อาการที่พบในสุนัข** ระยะฟักตัวหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง ๓-๘ สัปดาห์ ไม่เกิน ๖ เดือน และจะตายภายใน ๑๐ วันหลังจากแสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ **๑.ระยะแรก** สุนัขจะมีอารมณ์-นิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

**๒.ระยะตื่นตัว** สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวายตื่นตื่น หงุดหงิดไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง **๓.ระยะอัมพาต** สุนัขมีอาการคอหอยตกลิ้นมีสีแดงคล้ายห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขยอนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ น้ำลายไหล ขยอนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ซาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

**อาการที่พบในถิ่น** ส่วนใหญ่จะพบในถิ่นที่ติดต่อกัน 3 อาทิตย์-6 เดือน แต่บางรายมีไลอยะพักรไต่อมยบ่รอดอาทิตย์ ขี้ อาดเกินกว่า 1 ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ เป็นไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด และ ลามไปส่วนอื่นขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว

**อาการที่พบในขาจัว** ไลอยะพักรไต่อมยบ่รอดอาทิตย์ ขี้ อาดเกินกว่า 1 ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ เป็นไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด และ ลามไปส่วนอื่นขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว

- 1.ไลอยะพักร** มาจะมีอาลิม-นิไสปรุ่งไปจากเก้
- 2.ไลอยตื่นตัว** ขาจัวเล็มมีอาการทางประสาทกระวนกระวายตื่นตื่น รุกดจิดบ่อยู่นิ่ง รัดสิ่งของบ่เล็อม ม่านตาขยายกว้าง
- 3.ไลอยอ่ามะพาด** ขาจัวมีอาการอ่าทอยติกร ลิมมีสีแแดงถ้ำ ทอยอกรนกรปกรน้าจายไทล ยอนอาทธานถ้ายมีทยั้งอยู่ในล้าถ้ำ น้าจายไทล ซาอ่อนเพลย ขิจติบ่ได้ ลิมลิวอ่ามะพาด ขี้ติบ่ยั้งไวเวา และ ตายในที่สุด

# คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข ถ้าแนะนำล่าบผู้จุงขา

**1** นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (ปีแรกควรรฉีด ๒ ครั้ง) ขาจัวไปลิตวักขิมปรองกัน โลภขาจัวขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว (ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ๑-๗ วัน)

**2** ไม่ปล่อยสุนัขเพ่นพ่านในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่น่าสุนัขออกจากบ้านต้องอยู่ในสายจูง บ่บ่อยขาจัวไปทอขี้บในทอ ซาทาละนะ ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว

**3** ไม่นำสุนัขไปปล่อยและต้องคุมกำเนิดไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว

หยุดปล่อยหมา หยุดปัญหาหมาจรจัด  
หยุดปล่อยหมา หยุดปัญหาหมาจรจัด

“โรคนี ไม่มีทางรักษาให้หายได้” หากมีอาการแล้วตายทุกราย  
โลภขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว ขี้บขี้จายขี้สุดในขาจัว